



**Zuchtgeranie / Pelargonie**  
Pelargonium (alle Sorten)

**Pflanzentyp** Topfpflanze  
**Wuchshöhe** 30 bis 70 cm  
**Lebensdauer** einjährig oder mehrjährig  
**Blütezeit** zwischen Mai und September  
**Blütenfarbe** rosa, rot und weiss  
**Besonderheit** keine



**Standortansprüche und Pflegemassnahmen**

**Lichtbedarf** sonnig, Überwinterung im Keller  
**Bodenansprüche** nährhaft, durchlässig  
**Bodenfeuchtigkeit** mittelfeucht, keine Staunässe!  
**Giessen** häufig, im Sommer ein bis zwei Mal täglich  
**Düngen** regelmässig, meist wöchentlich  
**Schnitt** Rückschnitt im Frühjahr



**Blutroter Storchschnabel**  
Geranium sanguineum


**Pflanzentyp** Blütenpflanze / Topfpflanze  
**Wuchshöhe** 30 bis 50 cm  
**Lebensdauer** mehrjährig  
**Blütezeit** Mai bis Juli  
**Blütenfarbe** purpurrot  
**Besonderheit** keine

**Standortansprüche und Pflegemassnahmen**

**Lichtbedarf** sonnig bis halbschattig  
**Bodenansprüche** neutral bis schwach sauer  
**Bodenfeuchtigkeit** mässig trocken  
**Giessen** wenig bis selten  
**Düngen** nie  
**Schnitt** nicht nötig



Zuchtgeranien gehören zur Gattung Pelargonium und sind nur entfernt mit den «echten» Geranien verwandt. Pelargonien bieten Insekten nahezu keine Pollen und enthalten nur sehr wenig Nektar. Die «echten» Geranien, wie zum Beispiel der Blutrote Storchschnabel, werden hingegen von Bienen gerne angenommen und regelmässig besucht. Der erheblich geringere Wasserverbrauch ist aber wohl der wichtigste Unterschied. Müssen die aus Südafrika stammenden Pelargonien an warmen Sommertagen morgens und abends regelmässig gegossen werden, so kommt der Blutrote Storchschnabel mit bedeutend weniger Wasser aus. Der Aufwand reduziert sich um ein Vielfaches. Dabei eignet sich der Blutrote Storchschnabel für trockene und sonnige Beete oder auch zur Bepflanzung von Balkonkisten.



Blaubock